

表234 問35-2-2 1日に吸っている(た)本数

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	494 (100.0%)	28 (100.0%)	124 (100.0%)	214 (100.0%)	68 (100.0%)	60 (100.0%)
	10本未満	41 (8.3%)	4 (14.3%)	11 (8.9%)	13 (6.1%)	5 (7.4%)	8 (13.3%)
	10~20本未満	119 (24.1%)	14 (50.0%)	31 (25.0%)	34 (15.9%)	21 (30.9%)	19 (31.7%)
	20~30本未満	183 (37.0%)	6 (21.4%)	47 (37.9%)	89 (41.6%)	22 (32.4%)	19 (31.7%)
	30~40本未満	46 (9.3%)	2 (7.1%)	9 (7.3%)	29 (13.6%)	4 (5.9%)	2 (3.3%)
	40本以上	37 (7.5%)	2 (7.1%)	4 (3.2%)	19 (8.9%)	9 (13.2%)	3 (5.0%)
	未記入	68 (13.8%)	0 (0.0%)	22 (17.7%)	30 (14.0%)	7 (10.3%)	9 (15.0%)
	人数(人)	426	28	102	184	61	51
	平均	20.0	16.4	17.5	22.2	21.9	16.5
	標準偏差	11.7	9.4	8.3	11.8	15.7	10.9
女性	総数	140 (100.0%)	24 (100.0%)	58 (100.0%)	40 (100.0%)	10 (100.0%)	8 (100.0%)
	10本未満	29 (20.7%)	4 (16.7%)	14 (24.1%)	6 (15.0%)	2 (20.0%)	3 (37.5%)
	10~20本未満	49 (35.0%)	8 (33.3%)	18 (31.0%)	17 (42.5%)	3 (30.0%)	3 (37.5%)
	20~30本未満	22 (15.7%)	3 (12.5%)	8 (13.8%)	8 (20.0%)	2 (20.0%)	1 (12.5%)
	30~40本未満	4 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
	40本以上	3 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	未記入	33 (23.6%)	9 (37.5%)	18 (31.0%)	4 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (12.5%)
	人数(人)	107	15	40	36	9	7
	平均	18.5	11.1	10.7	15.6	15.1	9.7
	標準偏差	11.5	8.6	8.3	11.8	15.2	10.6

*母数は「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(た)」「吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

表235 現在習慣的に喫煙している人

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	709 (100.0%)	53 (100.0%)	104 (100.0%)	115 (100.0%)	159 (100.0%)	134 (100.0%)
	なし	473 (66.7%)	30 (56.6%)	87 (83.7%)	184 (160.0%)	92 (57.9%)	80 (59.7%)
	あり	236 (33.3%)	23 (43.4%)	81 (77.9%)	99 (86.1%)	20 (12.6%)	13 (9.7%)
女性	総数	815 (100.0%)	78 (100.0%)	132 (100.0%)	112 (100.0%)	153 (100.0%)	151 (100.0%)
	なし	758 (93.0%)	69 (88.5%)	161 (122.0%)	275 (245.5%)	126 (82.4%)	127 (84.1%)
	あり	57 (7.0%)	9 (11.5%)	21 (15.9%)	20 (17.9%)	5 (3.3%)	2 (1.3%)

*現在習慣的に喫煙している人とは、これまでに総数100本以上また6ヶ月以上たばこを吸っている者のうち、「この1ヶ月間毎日に毎日または時々煙草を吸っている」と回答した者。

*それぞれの項目の未記入の者を除く。

表236-1 問35-2-3 たばこを習慣的に吸うようになったのは何歳ですか(男性)

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	494 (100.0%)	28 (100.0%)	124 (100.0%)	214 (100.0%)	68 (100.0%)	60 (100.0%)
	12歳	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
	13歳	2 (0.4%)	1 (3.6%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	14歳	2 (0.4%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	15歳	9 (1.8%)	3 (10.7%)	4 (3.2%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)
	16歳	11 (2.2%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)	5 (2.3%)	1 (1.5%)	3 (5.0%)
	17歳	7 (1.4%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	5 (2.3%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)
	18歳	57 (11.5%)	3 (10.7%)	19 (15.3%)	27 (12.6%)	7 (10.3%)	1 (1.7%)
	19歳	18 (3.6%)	1 (3.6%)	4 (3.2%)	8 (3.7%)	5 (7.4%)	0 (0.0%)
	20歳	256 (51.8%)	16 (57.1%)	65 (52.4%)	117 (54.7%)	31 (45.6%)	27 (45.0%)
	21歳	17 (3.4%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)	6 (2.8%)	3 (4.4%)	6 (10.0%)
	22歳	18 (3.6%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)	7 (3.3%)	6 (8.8%)	3 (5.0%)
	23歳	6 (1.2%)	0 (0.0%)	3 (2.4%)	2 (0.9%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
	24歳	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
	25~29歳	21 (4.3%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)	7 (3.3%)	4 (5.9%)	8 (13.3%)
	30歳以上	11 (2.2%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	4 (1.9%)	3 (4.4%)	3 (5.0%)
	未記入	57 (11.5%)	1 (3.6%)	19 (15.3%)	25 (11.7%)	5 (7.4%)	7 (11.7%)
20歳未満(再掲)	107 (21.7%)	11 (39.3%)	30 (24.2%)	46 (21.5%)	14 (20.6%)	6 (10.0%)	

*母数は「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(た)」「吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

表236-2 問35-2-3 たばこを習慣的に吸うようになったのは何歳ですか(女性)

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
女性	総数	140 (100.0%)	24 (100.0%)	58 (100.0%)	40 (100.0%)	10 (100.0%)	8 (100.0%)
	12歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	13歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	14歳	1 (0.7%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	15歳	1 (0.7%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	16歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	17歳	2 (1.4%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	18歳	9 (6.4%)	1 (4.2%)	3 (5.2%)	4 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
	19歳	6 (4.3%)	3 (12.5%)	2 (3.4%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20歳	44 (31.4%)	5 (20.8%)	20 (34.5%)	16 (40.0%)	2 (20.0%)	1 (12.5%)
	21歳	8 (5.7%)	3 (12.5%)	3 (5.2%)	1 (2.5%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
	22歳	5 (3.6%)	2 (8.3%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)
	23歳	3 (2.1%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	24歳	2 (1.4%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	25~29歳	9 (6.4%)	0 (0.0%)	4 (6.9%)	3 (7.5%)	1 (10.0%)	1 (12.5%)
	30歳以上	21 (15.0%)	0 (0.0%)	4 (6.9%)	7 (17.5%)	5 (50.0%)	5 (62.5%)
	未記入	29 (20.7%)	7 (29.2%)	16 (27.6%)	6 (15.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20歳未満(再掲)	19 (13.6%)	7 (29.2%)	6 (10.3%)	5 (12.5%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)

* 母数は「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(た)」「吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

表237 問35-2-4 たばこをやめたいと思いますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	494 (100.0%)	28 (100.0%)	124 (100.0%)	214 (100.0%)	68 (100.0%)	60 (100.0%)
	やめたい	80 (16.2%)	8 (28.6%)	26 (21.0%)	35 (16.4%)	8 (11.8%)	3 (5.0%)
	本数を減らしたい	83 (16.8%)	8 (28.6%)	27 (21.8%)	37 (17.3%)	7 (10.3%)	4 (6.7%)
	やめたくない	34 (6.9%)	1 (3.6%)	14 (11.3%)	13 (6.1%)	4 (5.9%)	2 (3.3%)
	考えたことがない	52 (10.5%)	8 (28.6%)	16 (12.9%)	21 (9.8%)	2 (2.9%)	5 (8.3%)
	未記入	245 (49.6%)	3 (10.7%)	41 (33.1%)	108 (50.5%)	47 (69.1%)	46 (76.7%)
	総数	140 (100.0%)	24 (100.0%)	58 (100.0%)	40 (100.0%)	10 (100.0%)	8 (100.0%)
女性	やめたい	21 (15.0%)	4 (16.7%)	10 (17.2%)	4 (10.0%)	2 (20.0%)	1 (12.5%)
	本数を減らしたい	21 (15.0%)	2 (8.3%)	8 (13.8%)	9 (22.5%)	1 (10.0%)	1 (12.5%)
	やめたくない	7 (5.0%)	2 (8.3%)	1 (1.7%)	2 (5.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
	考えたことがない	12 (8.6%)	3 (12.5%)	5 (8.6%)	4 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	未記入	79 (56.4%)	13 (54.2%)	34 (58.6%)	21 (52.5%)	5 (50.0%)	6 (75.0%)

* 母数は「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(た)」「吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

表238 問36 週に何日お酒(アルコール)を飲みますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)	
男性	総数	699 (100.0%)	50 (100.0%)	166 (100.0%)	279 (100.0%)	112 (100.0%)	92 (100.0%)	
	週に1日以上	396 (56.7%)	17 (34.0%)	88 (53.0%)	183 (65.6%)	68 (60.7%)	40 (43.5%)	
	週に1日未満	42 (6.0%)	5 (10.0%)	17 (10.2%)	15 (5.4%)	4 (3.6%)	1 (1.1%)	
	ほとんど飲まない	261 (37.3%)	28 (56.0%)	61 (36.7%)	81 (29.0%)	40 (35.7%)	51 (55.4%)	
	週1~2日(再掲)	66 (9.4%)	7 (14.0%)	26 (15.7%)	22 (7.9%)	9 (8.0%)	2 (2.2%)	
	週3~4日(再掲)	53 (7.6%)	5 (10.0%)	16 (9.6%)	18 (6.5%)	8 (7.1%)	6 (6.5%)	
	週5~6日(再掲)	82 (11.7%)	4 (8.0%)	19 (11.4%)	42 (15.1%)	12 (10.7%)	5 (5.4%)	
	週7日(再掲)	194 (27.8%)	1 (2.0%)	27 (16.3%)	101 (36.2%)	38 (33.9%)	27 (29.3%)	
	女性	総数	808 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	290 (100.0%)	130 (100.0%)	128 (100.0%)
		週に1日以上	135 (16.7%)	14 (17.9%)	40 (22.0%)	57 (19.7%)	14 (10.8%)	10 (7.8%)
週に1日未満		56 (6.9%)	10 (12.8%)	23 (12.6%)	17 (5.9%)	5 (3.8%)	1 (0.8%)	
ほとんど飲まない		617 (76.4%)	54 (69.2%)	119 (65.4%)	216 (74.5%)	111 (85.4%)	117 (91.4%)	
週1~2日(再掲)		42 (5.2%)	8 (10.3%)	7 (3.8%)	19 (6.6%)	8 (6.2%)	0 (0.0%)	
週3~4日(再掲)		32 (4.0%)	1 (1.3%)	16 (8.8%)	9 (3.1%)	4 (3.1%)	2 (1.6%)	
週5~6日(再掲)		44 (5.2%)	1 (10.3%)	14 (3.8%)	22 (6.6%)	0 (6.2%)	7 (0.0%)	
週7日(再掲)		135 (5.2%)	14 (10.3%)	40 (3.8%)	57 (6.6%)	14 (6.2%)	10 (0.0%)	

* 60~69歳代男性で「週1日以上」に○を付けていて日数未記入の者が1人あったため再掲の合計が「週に1日以上」と一致しない

表239 問36-2 飲む日1日当たりの純アルコール摂取量(ml)の平均値と標準偏差

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)	
男性	週1回以上	人数(人)	396	17	88	183	68	40
		平均(ml)	40.0	43.0	42.2	42.7	33.6	31.9
		標準偏差(ml)	27.7	51.0	30.3	26.1	22.2	20.7
	週1回未満	人数(人)	42	5	17	15	4	1
		平均(ml)	42.2	69.5	50.5	31.5	20.2	14.0
		標準偏差(ml)	47.3	82.7	52.2	28.3	4.7	—
	総数	人数(人)	438	22	105	198	72	41
		平均(ml)	40.2	49.0	43.5	41.9	32.9	31.5
		標準偏差(ml)	30.0	58.5	34.6	26.4	21.8	20.6
女性	週1回以上	人数(人)	135	14	40	57	14	10
		平均(ml)	23.1	30.7	24.7	22.0	15.8	22.9
		標準偏差(ml)	15.9	23.1	18.2	13.1	8.5	14.6
	週1回未満	人数(人)	56	10	23	17	5	1
		平均(ml)	25.7	43.8	26.7	17.4	14.0	20.6
		標準偏差(ml)	24.9	34.6	28.4	5.5	0.0	—
	総数	人数(人)	191	24	63	74	19	11
		平均(ml)	23.9	36.2	25.4	21.0	15.3	22.7
		標準偏差(ml)	19.0	28.6	22.3	11.9	7.3	13.9

* 母数は「週に1日以上」「週1回未満」と回答した者

表240 「週に1日以上」飲酒する者の1日平均飲酒量(日本酒換算)の分布

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	396 (100.0%)	17 (100.0%)	88 (100.0%)	183 (100.0%)	68 (100.0%)	40 (100.0%)
	1合未満	116 (29.3%)	7 (41.2%)	24 (27.3%)	46 (25.1%)	25 (36.8%)	14 (35.0%)
	1~2合未満	135 (34.1%)	5 (29.4%)	35 (39.8%)	56 (30.6%)	24 (35.3%)	15 (37.5%)
	2~3合未満	82 (20.7%)	2 (11.8%)	11 (12.5%)	47 (25.7%)	13 (19.1%)	9 (22.5%)
	3~4合未満	36 (9.1%)	2 (11.8%)	9 (10.2%)	20 (10.9%)	4 (5.9%)	1 (2.5%)
	4~5合未満	18 (4.5%)	0 (0.0%)	4 (4.5%)	12 (6.6%)	1 (1.5%)	1 (2.5%)
	5合以上	9 (2.3%)	1 (5.9%)	5 (5.7%)	2 (1.1%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
	総数	135 (100.0%)	14 (100.0%)	40 (100.0%)	57 (100.0%)	14 (100.0%)	10 (100.0%)
女性	1合未満	80 (59.3%)	8 (57.1%)	25 (62.5%)	34 (59.6%)	9 (64.3%)	4 (40.0%)
	1~2合未満	39 (28.9%)	2 (14.3%)	11 (27.5%)	17 (29.8%)	5 (35.7%)	4 (40.0%)
	2~3合未満	12 (8.9%)	2 (14.3%)	2 (5.0%)	6 (10.5%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)
	3~4合未満	4 (3.0%)	2 (14.3%)	2 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	4~5合未満	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	5合以上	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

* 母数は「週に1日以上」と回答した者

表241 飲酒習慣のある者の割合

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	「週に何日お酒を飲みますか」に回答した者	699	50	166	279	112	92
	飲酒習慣あり	242 (34.6%)	5 (10.0%)	52 (31.3%)	124 (44.4%)	37 (33.0%)	24 (26.1%)
女性	「週に何日お酒を飲みますか」に回答した者	808	78	182	290	130	128
	飲酒習慣あり	38 (4.7%)	1 (1.3%)	13 (7.1%)	16 (5.5%)	3 (2.3%)	5 (3.9%)

* 飲酒習慣ありとは週3日以上、1回日本換算して1合以上の者

* 母数は「週に何日お酒を飲みますか」に回答した者

表242 多量飲酒者の割合

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	「週に何日お酒を飲みますか」に回答した者	699	50	166	279	112	92
	多量飲酒者	53 (7.6%)	2 (4.0%)	16 (9.6%)	29 (10.4%)	4 (3.6%)	2 (2.2%)
女性	「週に何日お酒を飲みますか」に回答した者	808	78	182	290	130	128
	多量飲酒者	2 (0.2%)	0 (0.0%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

* 多量飲酒者とは週に1日以上、または週に1回未満の飲酒者で1回当たりの飲酒するアルコール量を日本酒換算し、次のいずれかに該当する者

- ① 飲酒日1日当たりの飲酒量が5合以上
- ② 飲酒日1日当たりの飲酒量が4合以上5合未満で、飲酒の頻度が週5日以上
- ③ 飲酒日1日当たりの飲酒量が3合以上4合未満で、飲酒の頻度が毎日

【アルコール量の求め方】

アルコール度数(容量%) × 容量(ml) × アルコール比重(0.8) = アルコール量(g)

【アルコール量の日本酒換算の方法】

アルコール量(g) ÷ アルコール比重(0.8) ÷ 日本酒のアルコール度数(15%) ÷ 1合(180ml) = アルコールの量の日本酒換算

(再掲) 多量飲酒者(30~64歳以上)

	男性	女性
総数	445	472
受けている	45 (10.1%)	2 (0.4%)

表243 問36-3 休肝日を週何日設けていますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	438 (100.0%)	22 (100.0%)	105 (100.0%)	198 (100.0%)	72 (100.0%)	41 (100.0%)
	連続した2日を含む2日以上設けている	89 (20.3%)	11 (50.0%)	31 (29.5%)	32 (16.2%)	9 (12.5%)	6 (14.6%)
	連続していないが2日以上設けている	52 (11.9%)	3 (13.6%)	18 (17.1%)	18 (9.1%)	11 (15.3%)	2 (4.9%)
	週1日設けている	57 (13.0%)	2 (9.1%)	12 (11.4%)	27 (13.6%)	10 (13.9%)	6 (14.6%)
	休肝日は設けていない	234 (53.4%)	6 (27.3%)	43 (41.0%)	118 (59.6%)	41 (56.9%)	26 (63.4%)
	未記入	6 (1.4%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	3 (1.5%)	1 (1.4%)	1 (2.4%)
	総数	191 (100.0%)	24 (100.0%)	63 (100.0%)	74 (100.0%)	19 (100.0%)	11 (100.0%)
女性	連続した2日を含む2日以上設けている	70 (36.6%)	12 (50.0%)	25 (39.7%)	21 (28.4%)	10 (52.6%)	2 (18.2%)
	連続していないが2日以上設けている	46 (24.1%)	5 (20.8%)	18 (28.6%)	19 (25.7%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)
	週1日設けている	26 (13.6%)	2 (8.3%)	8 (12.7%)	12 (16.2%)	2 (10.5%)	2 (18.2%)
	休肝日は設けていない	46 (24.1%)	5 (20.8%)	12 (19.0%)	20 (27.0%)	2 (10.5%)	7 (63.6%)
	未記入	3 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.7%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)
	総数	191 (100.0%)	24 (100.0%)	63 (100.0%)	74 (100.0%)	19 (100.0%)	11 (100.0%)
	総数	191 (100.0%)	24 (100.0%)	63 (100.0%)	74 (100.0%)	19 (100.0%)	11 (100.0%)

*母数は「週1回以上」「週1日未満」飲酒していると回答した者

表244 問37 過去1年間に、健診(健康診断や健康診査)や人間ドックを受けたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	703 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	280 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	480 (68.3%)	23 (45.1%)	123 (73.7%)	211 (75.4%)	72 (64.3%)	51 (54.8%)
	ない	223 (31.7%)	28 (54.9%)	44 (26.3%)	69 (24.6%)	40 (35.7%)	42 (45.2%)
女性	総数	809 (100.0%)	78 (100.0%)	180 (100.0%)	293 (100.0%)	130 (100.0%)	128 (100.0%)
	ある	448 (55.4%)	38 (48.7%)	74 (41.1%)	196 (66.9%)	78 (60.0%)	62 (48.4%)
	ない	361 (44.6%)	40 (51.3%)	106 (58.9%)	97 (33.1%)	52 (40.0%)	66 (51.6%)

表245 問37-2 健診の結果指摘を受けましたか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	480 (100.0%)	23 (100.0%)	123 (100.0%)	211 (100.0%)	72 (100.0%)	51 (100.0%)
	はい	264 (55.0%)	2 (8.7%)	49 (39.8%)	129 (61.1%)	51 (70.8%)	33 (64.7%)
	いいえ	215 (44.8%)	21 (91.3%)	74 (60.2%)	81 (38.4%)	21 (29.2%)	18 (35.3%)
	未記入	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
女性	総数	448 (100.0%)	38 (100.0%)	74 (100.0%)	196 (100.0%)	78 (100.0%)	62 (100.0%)
	はい	203 (45.3%)	4 (10.5%)	13 (17.6%)	99 (50.5%)	50 (64.1%)	37 (59.7%)
	いいえ	243 (54.2%)	34 (89.5%)	61 (82.4%)	96 (49.0%)	27 (34.6%)	25 (40.3%)
	未記入	2 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)

* 母数は「健診を受けたことがある」と回答した者

表246 問37-2-2 どのようなことについて指摘を受けましたか(複数回答)

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	過去1年間に健診を受けたことがある者	480	23	123	211	72	51
	肥満	74 (15.4%)	1 (4.3%)	20 (16.3%)	36 (17.1%)	14 (19.4%)	3 (5.9%)
	高血圧症	133 (27.7%)	0 (0.0%)	11 (8.9%)	66 (31.3%)	29 (40.3%)	27 (52.9%)
	糖尿病	53 (11.0%)	0 (0.0%)	4 (3.3%)	32 (15.2%)	9 (12.5%)	8 (15.7%)
	脂質異常症	143 (29.8%)	1 (4.3%)	39 (31.7%)	73 (34.6%)	23 (31.9%)	7 (13.7%)
女性	過去1年間に健診を受けたことがある者	448	38	74	196	78	62
	肥満	49 (10.9%)	1 (2.6%)	7 (9.5%)	26 (13.3%)	8 (10.3%)	7 (11.3%)
	高血圧症	72 (16.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (11.7%)	24 (30.8%)	25 (40.3%)
	糖尿病	22 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (4.6%)	7 (9.0%)	6 (9.7%)
	脂質異常症	120 (26.8%)	3 (7.9%)	7 (9.5%)	72 (36.7%)	25 (32.1%)	13 (21.0%)

* 母数は「健診を受けたことがある」と回答した者

表247 問37-2-3 指摘を受けたことについて保健指導を受けましたか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	264 (100.0%)	2 (100.0%)	49 (100.0%)	129 (100.0%)	51 (100.0%)	33 (100.0%)
	はい	161 (61.0%)	1 (50.0%)	23 (46.9%)	88 (68.2%)	27 (52.9%)	22 (66.7%)
	いいえ	103 (39.0%)	1 (50.0%)	26 (53.1%)	41 (31.8%)	24 (47.1%)	11 (33.3%)
	未記入	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
女性	総数	203 (100.0%)	4 (100.0%)	13 (100.0%)	99 (100.0%)	50 (100.0%)	37 (100.0%)
	はい	99 (48.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	49 (49.5%)	28 (56.0%)	22 (59.5%)
	いいえ	102 (50.2%)	4 (100.0%)	13 (100.0%)	49 (49.5%)	21 (42.0%)	15 (40.5%)
	未記入	2 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)

* 母数は「肥満」「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」について指摘を受けたと回答した者

* 女性60歳代で1人指導を受けた項目に未記入があったため、指摘を受けた者と総数が一致しない

表248 問37-2-3(付問) 指導された内容についての程度実行されていますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	161 (100.0%)	1 (100.0%)	23 (100.0%)	88 (100.0%)	27 (100.0%)	22 (100.0%)
	おおむね実行できている	66 (41.0%)	1 (100.0%)	5 (21.7%)	34 (38.6%)	13 (48.1%)	13 (59.1%)
	一部実行できている	71 (44.1%)	0 (0.0%)	10 (43.5%)	43 (48.9%)	12 (44.4%)	6 (27.3%)
	実行していない	24 (14.9%)	0 (0.0%)	8 (34.8%)	11 (12.5%)	2 (7.4%)	3 (13.6%)
女性	総数	99 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	49 (100.0%)	28 (100.0%)	22 (100.0%)
	おおむね実行できている	51 (51.5%)	0 (-)	0 (-)	17 (34.7%)	19 (67.9%)	15 (68.2%)
	一部実行できている	44 (44.4%)	0 (-)	0 (-)	29 (59.2%)	8 (28.6%)	7 (31.8%)
	実行していない	4 (4.0%)	0 (-)	0 (-)	3 (6.1%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)

* 母数は「指摘を受けたことについて保健指導を受けた」者

表249 問37-2-4 最終的に医療機関を受診するように勧められましたか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	264 (100.0%)	2 (100.0%)	24 (100.0%)	48 (100.0%)	71 (100.0%)	64 (100.0%)
	はい	111 (42.0%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	17 (35.4%)	37 (52.1%)	32 (50.0%)
	いいえ	54 (20.5%)	1 (50.0%)	8 (33.3%)	10 (20.8%)	14 (19.7%)	13 (20.3%)
	未記入	99 (37.5%)	1 (50.0%)	14 (58.3%)	21 (43.8%)	20 (28.2%)	19 (29.7%)
女性	総数	203 (100.0%)	4 (100.0%)	9 (100.0%)	14 (100.0%)	59 (100.0%)	58 (100.0%)
	はい	69 (34.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	15 (25.4%)	26 (44.8%)
	いいえ	38 (18.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	14 (23.7%)	8 (13.8%)
	未記入	96 (47.3%)	4 (100.0%)	9 (100.0%)	7 (50.0%)	30 (50.8%)	24 (41.4%)

* 母数は「健診の結果指摘を受けた」者

表250 問37-2-4(付問) その後、医療機関に受診しましたか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	111 (100.0%)	0	10	65	19	17
	はい	103 (92.8%)	0	8	61	18	16
	いいえ	8 (7.2%)	0	2	4	1	1
	未記入	0 (0.0%)	0	0	0	0	0
女性	総数	69 (100.0%)	0	0	30	23	16
	はい	62 (89.9%)	0	0	26	20	16
	いいえ	6 (8.7%)	0	0	4	2	0
	未記入	1 (1.4%)	0	0	0	1	0

*母数は「最終的に医療機関を受診するように勧められた」者

表251 問38 これまでに医師から高血圧症と言われたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	702 (100.0%)	51	167	279	112	93
	ある	192 (27.4%)	1	12	83	50	46
	ない	510 (72.6%)	50	155	196	62	47
女性	総数	810 (100.0%)	78	182	292	130	128
	ある	181 (22.3%)	0	4	57	47	73
	ない	629 (77.7%)	78	178	235	83	55

表252 問38-2 高血圧症の治療を受けたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	192 (100.0%)	1	12	83	50	46
	現在受けている	150 (78.1%)	0	1	66	43	40
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	10 (5.2%)	0	4	3	2	1
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	11 (5.7%)	1	1	2	3	4
	ほとんど治療を受けたことがない	21 (10.9%)	0	6	12	2	1
	女性	総数	181 (100.0%)	0	4	57	47
現在受けている	157 (86.7%)	0	1	48	41	67	
以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	10 (5.5%)	0	2	2	1	5	
以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	5 (2.8%)	0	0	3	1	1	
ほとんど治療を受けたことがない	9 (5.0%)	0	1	4	4	0	

*母数は「これまでに医師から高血圧症と言われたことがある」者

表253 問39 これまでに医師から脂質異常症(高脂血症)と言われたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	702 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	279 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	103 (14.7%)	0 (0.0%)	12 (7.2%)	60 (21.5%)	19 (17.0%)	12 (12.9%)
	ない	599 (85.3%)	51 (100.0%)	155 (92.8%)	219 (78.5%)	93 (83.0%)	81 (87.1%)
女性	総数	811 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	293 (100.0%)	130 (100.0%)	128 (100.0%)
	ある	109 (13.4%)	1 (1.3%)	5 (2.7%)	52 (17.7%)	30 (23.1%)	21 (16.4%)
	ない	702 (86.6%)	77 (98.7%)	177 (97.3%)	241 (82.3%)	100 (76.9%)	107 (83.6%)

表254 問39-2 脂質異常症の治療を受けたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	103 (100.0%)	0 —	6 (200.0%)	16 (375.0%)	34 (55.9%)	26 (46.2%)
	現在受けている	40 (38.8%)	0 —	3 (50.0%)	22 (137.5%)	8 (23.5%)	7 (26.9%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	12 (11.7%)	0 —	1 (16.7%)	7 (43.8%)	3 (8.8%)	1 (3.8%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	8 (7.8%)	0 —	1 (16.7%)	4 (25.0%)	2 (5.9%)	1 (3.8%)
	ほとんど治療を受けたことがない	43 (41.7%)	0 —	7 (116.7%)	27 (168.8%)	6 (17.6%)	3 (11.5%)
女性	総数	109 (100.0%)	1 (100.0%)	3 (166.7%)	8 (650.0%)	26 (115.4%)	35 (60.0%)
	現在受けている	47 (43.1%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	17 (212.5%)	13 (50.0%)	16 (45.7%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	27 (24.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (187.5%)	7 (26.9%)	5 (14.3%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	7 (6.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)
	ほとんど治療を受けたことがない	28 (25.7%)	1 (100.0%)	4 (133.3%)	16 (200.0%)	7 (26.9%)	0 (0.0%)

* 母数は「これまでに医師から脂質異常症と言われたことがある」者

表255 問40 これまでに医師から糖尿病と言われたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	703 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	280 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	75 (10.7%)	0 (0.0%)	4 (2.4%)	44 (15.7%)	14 (12.5%)	13 (14.0%)
	ない	628 (89.3%)	51 (100.0%)	163 (97.6%)	236 (84.3%)	98 (87.5%)	80 (86.0%)
女性	総数	810 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	293 (100.0%)	129 (100.0%)	128 (100.0%)
	ある	39 (4.8%)	0 (0.0%)	2 (1.1%)	12 (4.1%)	12 (9.3%)	13 (10.2%)
	ない	771 (95.2%)	78 (100.0%)	180 (98.9%)	281 (95.9%)	117 (90.7%)	115 (89.8%)

表256 問40-2 糖尿病の治療を受けたことがありますか

		総数	青年期	壮年期	中年期	前期高齢期	後期高齢期
男性	総数	75 (100.0%)	0	4	44	14	13
	現在受けている	52 (69.3%)	0	2	30	10	10
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	7 (9.3%)	0	1	2	3	1
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	4 (5.3%)	0	1	1	0	2
	ほとんど治療を受けたことがない	12 (16.0%)	0	0	11	1	0
	総数	39 (100.0%)	0	2	12	12	13
女性	現在受けている	33 (84.6%)	0	1	11	11	10
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	3 (7.7%)	0	1	1	0	1
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	0 (0.0%)	0	0	0	0	0
	ほとんど治療を受けたことがない	3 (7.7%)	0	0	0	1	2
	総数	39 (100.0%)	0	2	12	12	13
	現在受けている	33 (84.6%)	0	1	11	11	10
以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	3 (7.7%)	0	1	1	0	1	
以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	
ほとんど治療を受けたことがない	3 (7.7%)	0	0	0	1	2	

*母数は「これまでに医師から糖尿病と言われたことがある」者

(再掲)糖尿病といわれ、治療を受けている人の割合(30~64歳)

総数	62
現在受けている	44 (71.0%)

表257 問41 これまでに医師から虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)と言われたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	702 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	279 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	34 (4.8%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	14 (12.2%)	8 (5.0%)	10 (7.5%)
	ない	668 (95.2%)	51 (96.2%)	165 (158.7%)	265 (230.4%)	104 (65.4%)	83 (61.9%)
女性	総数	811 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	293 (100.0%)	130 (100.0%)	128 (100.0%)
	ある	28 (3.5%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	6 (2.0%)	6 (4.6%)	15 (11.7%)
	ない	783 (96.5%)	78 (100.0%)	181 (99.5%)	287 (98.0%)	124 (95.4%)	113 (88.3%)

表258 問41-2 虚血性心疾患の治療を受けたことがありますか

		総数	青年期	壮年期	中年期	前期高齢期	後期高齢期
男性	総数	34 (100.0%)	0	2 (100.0%)	14 (100.0%)	8 (100.0%)	10 (100.0%)
	現在受けている	19 (55.9%)	0	1 (50.0%)	9 (64.3%)	2 (25.0%)	7 (70.0%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	8 (23.5%)	0	1 (50.0%)	4 (28.6%)	2 (25.0%)	1 (10.0%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	2 (5.9%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (10.0%)
	ほとんど治療を受けたことがない	5 (14.7%)	0	0 (0.0%)	1 (7.1%)	3 (37.5%)	1 (10.0%)
	総数	28 (100.0%)	0	1 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	15 (100.0%)
女性	現在受けている	15 (53.6%)	0	0 (0.0%)	3 (50.0%)	5 (83.3%)	7 (46.7%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	7 (25.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	3 (10.7%)	0	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
	ほとんど治療を受けたことがない	3 (10.7%)	0	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)
	総数	28 (100.0%)	0	1 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	15 (100.0%)

* 母数は「これまでに医師から虚血性心疾患と言われたことがある」者

表259 問42 これまでに医師から脳卒中(脳出血、脳梗塞など)と言われたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	702 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	279 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	37 (5.3%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	11 (3.9%)	9 (8.0%)	16 (17.2%)
	ない	665 (94.7%)	51 (100.0%)	166 (99.4%)	268 (96.1%)	103 (92.0%)	77 (82.8%)
女性	総数	812 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	293 (100.0%)	130 (100.0%)	129 (100.0%)
	ある	22 (2.7%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	3 (1.0%)	7 (5.4%)	11 (8.5%)
	ない	790 (97.3%)	77 (98.7%)	182 (100.0%)	290 (99.0%)	123 (94.6%)	118 (91.5%)

表260 問42-2 脳卒中の治療を受けたことがありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	37 (100.0%)	0	1 (100.0%)	11	9 (100.0%)	16 (100.0%)
	現在受けている	19 (51.4%)	0	0	7	3 (33.3%)	9 (56.3%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	15 (40.5%)	0	0	4	5 (55.6%)	6 (37.5%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	1 (2.7%)	0	0	0	0	1 (6.3%)
	ほとんど治療を受けたことがない	1 (2.7%)	0	0	0	1 (11.1%)	0
	未記入	1 (2.7%)	0	1 (100.0%)	0	0	0
	総数	22 (100.0%)	1 (100.0%)	0	3 (100.0%)	7 (100.0%)	11 (100.0%)
女性	現在受けている	16 (72.7%)	1 (100.0%)	0	2 (66.7%)	6 (85.7%)	7 (63.6%)
	以前に受けたことがあるが、医師の指示で現在は受けていない(経過観察中含む)	6 (27.3%)	0	0	1 (33.3%)	1 (14.3%)	4 (36.4%)
	以前に受けたことがあるが、自己判断で現在は受けていない	0 (0.0%)	0	0	0	0	0
	ほとんど治療を受けたことがない	0 (0.0%)	0	0	0	0	0
	未記入	0 (0.0%)	0	0	0	0	0
	総数	0 (0.0%)	0	0	0	0	0

*母数は「これまでに医師から脳卒中と言われたことがある」者

表261 問43 その他に治療中の病気がありますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	698 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	277 (100.0%)	112 (100.0%)	91 (100.0%)
	ある	138 (19.8%)	3 (5.9%)	11 (6.6%)	49 (17.7%)	37 (33.0%)	38 (41.8%)
	ない	560 (80.2%)	48 (94.1%)	156 (93.4%)	228 (82.3%)	75 (67.0%)	53 (58.2%)
女性	総数	806 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	292 (100.0%)	127 (100.0%)	127 (100.0%)
	ある	204 (25.3%)	9 (11.5%)	16 (8.8%)	73 (25.0%)	43 (33.9%)	63 (49.6%)
	ない	602 (74.7%)	69 (88.5%)	166 (91.2%)	219 (75.0%)	84 (66.1%)	64 (50.4%)

表262 問43-2 現在治療中の病気(複数回答)

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	「治療中の病気がある」者	138	3	11	49	37	38
	肝臓病	9 (6.5%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	5 (10.2%)	3 (8.1%)	0 (0.0%)
	貧血	7 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (8.2%)	2 (5.4%)	1 (2.6%)
	胃腸病	10 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.1%)	3 (8.1%)	5 (13.2%)
	がん	12 (8.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.1%)	4 (10.8%)	5 (13.2%)
	腰痛ひざ痛関節痛等関節の病気	40 (29.0%)	1 (33.3%)	4 (36.4%)	9 (18.4%)	14 (37.8%)	12 (31.6%)
	疾病その他	69 (50.0%)	2 (66.7%)	7 (63.6%)	28 (57.1%)	14 (37.8%)	18 (47.4%)
女性	「治療中の病気がある」者	806	78	182	292	127	127
	肝臓病	8 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.7%)	2 (1.6%)	1 (0.8%)
	貧血	10 (1.2%)	2 (2.6%)	4 (2.2%)	2 (0.7%)	1 (0.8%)	1 (0.8%)
	胃腸病	15 (1.9%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	8 (2.7%)	2 (1.6%)	4 (3.1%)
	がん	12 (1.5%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	7 (2.4%)	1 (0.8%)	3 (2.4%)
	腰痛ひざ痛関節痛等関節の病気	91 (11.3%)	2 (2.6%)	1 (0.5%)	26 (8.9%)	24 (18.9%)	38 (29.9%)
	疾病その他	101 (12.5%)	4 (5.1%)	11 (6.0%)	41 (14.0%)	23 (18.1%)	22 (17.3%)

* 母数は「治療中の病気がある」と回答した者

表263 問44 過去1年間に、がん検診を受けましたか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	701 (100.0%)	51 (100.0%)	167 (100.0%)	278 (100.0%)	112 (100.0%)	93 (100.0%)
	ある	279 (39.8%)	2 (3.9%)	44 (26.3%)	133 (47.8%)	60 (53.6%)	40 (43.0%)
	ない	422 (60.2%)	49 (96.1%)	123 (73.7%)	145 (52.2%)	52 (46.4%)	53 (57.0%)
女性	総数	808 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	291 (100.0%)	129 (100.0%)	128 (100.0%)
	ある	380 (47.0%)	13 (16.7%)	92 (50.5%)	172 (59.1%)	60 (46.5%)	43 (33.6%)
	ない	428 (53.0%)	65 (83.3%)	90 (49.5%)	119 (40.9%)	69 (53.5%)	85 (66.4%)

表264 問44-2 がん検診を受けた人の受診したがん検診(複数回答)

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	胃がん検診	219 (78.5%)	2 (100.0%)	37 (84.1%)	104 (78.2%)	48 (80.0%)	28 (70.0%)
	肺がん検診	173 (62.0%)	2 (100.0%)	33 (75.0%)	77 (57.9%)	38 (63.3%)	23 (57.5%)
	大腸がん検診	172 (61.6%)	0 (0.0%)	30 (68.2%)	84 (63.2%)	36 (60.0%)	22 (55.0%)
	上記は受けていない	10 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	6 (4.5%)	2 (3.3%)	1 (2.5%)
	女性	胃がん検診	213 (56.1%)	1 (7.7%)	32 (34.8%)	111 (64.5%)	41 (68.3%)
肺がん検診	198 (52.1%)	1 (7.7%)	31 (33.7%)	96 (55.8%)	42 (70.0%)	28 (65.1%)	
子宮がん検診	216 (56.8%)	11 (84.6%)	73 (79.3%)	101 (58.7%)	27 (45.0%)	4 (9.3%)	
乳がん検診	179 (47.1%)	6 (46.2%)	40 (43.5%)	103 (59.9%)	28 (46.7%)	2 (4.7%)	
大腸がん検診	197 (51.8%)	1 (7.7%)	31 (33.7%)	98 (57.0%)	38 (63.3%)	29 (67.4%)	
上記は受けていない	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	

表265 問45 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)を知っていますか

		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	701 (100.0%)	51 (100.0%)	168 (100.0%)	279 (100.0%)	112 (100.0%)	91 (100.0%)
	内容を知っている	439 (62.6%)	27 (52.9%)	114 (67.9%)	200 (71.7%)	68 (60.7%)	30 (33.0%)
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	209 (29.8%)	21 (41.2%)	51 (30.4%)	70 (25.1%)	35 (31.3%)	32 (35.2%)
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	53 (7.6%)	3 (5.9%)	3 (1.8%)	9 (3.2%)	9 (8.0%)	29 (31.9%)
女性	総数	808 (100.0%)	78 (100.0%)	182 (100.0%)	292 (100.0%)	128 (100.0%)	128 (100.0%)
	内容を知っている	503 (62.3%)	46 (59.0%)	123 (67.6%)	215 (73.6%)	76 (59.4%)	43 (33.6%)
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	247 (30.6%)	31 (39.7%)	58 (31.9%)	75 (25.7%)	40 (31.3%)	43 (33.6%)
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	58 (7.2%)	1 (1.3%)	1 (0.5%)	2 (0.7%)	12 (9.4%)	42 (32.8%)

3 栄養摂取状況調査

表266 朝食の欠食・外食等食事の状況

		総数	乳幼児期 (1~5歳)	学童期 (6~12歳)	思春期 (13~19歳)	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	322 (100.0%)	20 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	14 (100.0%)	61 (100.0%)	99 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (100.0%)
	外食・給食	9 (2.8%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (9.8%)	1 (1.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)
	調理済み食品	8 (2.5%)	2 (10.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	3 (3.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)
	家庭食	271 (84.2%)	17 (85.0%)	24 (92.3%)	22 (84.6%)	11 (78.6%)	40 (65.6%)	87 (87.9%)	40 (90.9%)	30 (93.8%)
	その他1	12 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	4 (6.6%)	4 (4.0%)	2 (4.5%)	1 (3.1%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	22 (6.8%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	3 (11.5%)	3 (21.4%)	10 (16.4%)	4 (4.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)
女性	総数	340 (100.0%)	13 (100.0%)	27 (100.0%)	22 (100.0%)	26 (100.0%)	58 (100.0%)	94 (100.0%)	49 (100.0%)	51 (100.0%)
	外食・給食	2 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	調理済み食品	14 (4.1%)	1 (7.7%)	2 (7.4%)	1 (4.5%)	1 (3.8%)	3 (5.2%)	2 (2.1%)	3 (6.1%)	1 (2.0%)
	家庭食	300 (88.2%)	12 (92.3%)	24 (88.9%)	18 (81.8%)	20 (76.9%)	50 (86.2%)	84 (89.4%)	43 (87.8%)	49 (96.1%)
	その他1	13 (3.8%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	2 (9.1%)	2 (7.7%)	1 (1.7%)	4 (4.3%)	2 (4.1%)	1 (2.0%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	11 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	3 (11.5%)	3 (5.2%)	3 (3.2%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)

* その他1は「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」、その他2は「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみ」のもの。

表267 昼食の欠食・外食等食事の状況

		総数	乳幼児期 (1~5歳)	学童期 (6~12歳)	思春期 (13~19歳)	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	322 (100.0%)	20 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	14 (100.0%)	61 (100.0%)	99 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (100.0%)
	外食・給食	113 (35.1%)	7 (35.0%)	20 (76.9%)	8 (30.8%)	6 (42.9%)	34 (55.7%)	34 (34.3%)	2 (4.5%)	2 (6.3%)
	調理済み食品	14 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.3%)	4 (4.0%)	5 (11.4%)	3 (9.4%)
	家庭食	190 (59.0%)	13 (65.0%)	6 (23.1%)	18 (69.2%)	8 (57.1%)	22 (36.1%)	60 (60.6%)	37 (84.1%)	26 (81.3%)
	その他1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	5 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.9%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)
女性	総数	340 (100.0%)	13 (100.0%)	27 (100.0%)	22 (100.0%)	26 (100.0%)	58 (100.0%)	94 (100.0%)	49 (100.0%)	51 (100.0%)
	外食・給食	67 (19.7%)	3 (23.1%)	24 (88.9%)	8 (36.4%)	4 (15.4%)	8 (13.8%)	16 (17.0%)	3 (6.1%)	1 (2.0%)
	調理済み食品	19 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	1 (3.8%)	4 (6.9%)	5 (5.3%)	4 (8.2%)	3 (5.9%)
	家庭食	251 (73.8%)	10 (76.9%)	3 (11.1%)	12 (54.5%)	21 (80.8%)	44 (75.9%)	72 (76.6%)	42 (85.7%)	47 (92.2%)
	その他1	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	2 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

* その他1は「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」、その他2は「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみ」のもの。

表268 夕食の欠食・外食等食事の状況

		総数	乳幼児期 (1~5歳)	学童期 (6~12歳)	思春期 (13~19歳)	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	322 (100.0%)	20 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	14 (100.0%)	61 (100.0%)	99 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (100.0%)
	外食・給食	21 (6.5%)	1 (5.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	12 (19.7%)	3 (3.0%)	1 (2.3%)	1 (3.1%)
	調理済み食品	7 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.3%)	2 (2.0%)	1 (2.3%)	2 (6.3%)
	家庭食	291 (90.4%)	18 (90.0%)	25 (96.2%)	26 (100.0%)	12 (85.7%)	46 (75.4%)	93 (93.9%)	42 (95.5%)	29 (90.6%)
	その他1	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	2 (0.6%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	総数	340 (100.0%)	13 (100.0%)	27 (100.0%)	22 (100.0%)	26 (100.0%)	58 (100.0%)	94 (100.0%)	49 (100.0%)	51 (100.0%)
女性	外食・給食	8 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)	2 (4.1%)	0 (0.0%)
	調理済み食品	9 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	3 (3.2%)	2 (4.1%)	1 (2.0%)
	家庭食	323 (95.0%)	13 (100.0%)	27 (100.0%)	22 (100.0%)	20 (76.9%)	55 (94.8%)	91 (96.8%)	45 (91.8%)	50 (98.0%)
	その他1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	その他2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	欠食	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

* その他1は「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」、その他2は「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみ」のもの。

生活活動

表269 中強度(仕事・家事)

		人数(%)							
		総数	学童期 (8~12歳)	思春期 (13~19歳)	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	294 (100.0%)	18 (100.0%)	26 (100.0%)	14 (100.0%)	61 (100.0%)	99 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (100.0%)
	ほとんどしない	69 (23.5%)	8 (44.4%)	9 (34.6%)	2 (14.3%)	9 (14.8%)	19 (19.2%)	11 (25.0%)	11 (34.4%)
	30分前後	37 (12.6%)	0 (0.0%)	8 (30.8%)	2 (14.3%)	11 (18.0%)	8 (8.1%)	3 (6.8%)	5 (15.6%)
	1時間前後	48 (16.3%)	8 (44.4%)	5 (19.2%)	2 (14.3%)	7 (11.5%)	18 (18.2%)	5 (11.4%)	3 (9.4%)
	2時間前後	140 (47.6%)	2 (11.1%)	4 (15.4%)	8 (57.1%)	34 (55.7%)	54 (54.5%)	25 (56.8%)	13 (40.6%)
	(またはそれ)以上								
女性	総数	319 (100.0%)	19 (100.0%)	22 (100.0%)	26 (100.0%)	58 (100.0%)	94 (100.0%)	49 (100.0%)	51 (100.0%)
	ほとんどしない	52 (16.3%)	7 (36.8%)	8 (36.4%)	5 (19.2%)	5 (8.6%)	4 (4.3%)	7 (14.3%)	16 (31.4%)
	30分前後	46 (14.4%)	4 (21.1%)	4 (18.2%)	6 (23.1%)	6 (10.3%)	7 (7.4%)	11 (22.4%)	8 (15.7%)
	1時間前後	97 (30.4%)	7 (36.8%)	8 (36.4%)	6 (23.1%)	22 (37.9%)	35 (37.2%)	5 (10.2%)	14 (27.5%)
	2時間前後	124 (38.9%)	1 (5.3%)	2 (9.1%)	9 (34.6%)	25 (43.1%)	48 (51.1%)	26 (53.1%)	13 (25.5%)
	(またはそれ)以上								

表270 高強度(仕事・家事)

		総数	学童期 (8~12歳)	思春期 (13~19歳)	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	294 (100.0%)	18 (100.0%)	26 (100.0%)	14 (100.0%)	61 (100.0%)	99 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (100.0%)
	ほとんどしない	145 (49.3%)	8 (44.4%)	13 (50.0%)	8 (57.1%)	22 (36.1%)	44 (44.4%)	28 (63.6%)	22 (68.8%)
	15分前後	25 (8.5%)	1 (5.6%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	6 (9.8%)	9 (9.1%)	3 (6.8%)	4 (12.5%)
	30分前後	27 (9.2%)	3 (16.7%)	5 (19.2%)	1 (7.1%)	7 (11.5%)	9 (9.1%)	2 (4.5%)	0 (0.0%)
	1時間前後	97 (33.0%)	6 (33.3%)	6 (23.1%)	5 (35.7%)	26 (42.6%)	37 (37.4%)	11 (25.0%)	6 (18.8%)
	(またはそれ)以上								
女性	総数	319 (100.0%)	19 (100.0%)	22 (100.0%)	26 (100.0%)	58 (100.0%)	94 (100.0%)	49 (100.0%)	51 (100.0%)
	ほとんどしない	220 (69.0%)	13 (68.4%)	17 (77.3%)	23 (88.5%)	38 (65.5%)	57 (60.6%)	27 (55.1%)	45 (88.2%)
	15分前後	50 (15.7%)	1 (5.3%)	1 (4.5%)	1 (3.8%)	10 (17.2%)	18 (19.1%)	14 (28.6%)	5 (9.8%)
	30分前後	17 (5.3%)	1 (5.3%)	1 (4.5%)	1 (3.8%)	6 (10.3%)	7 (7.4%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)
	1時間前後	32 (10.0%)	4 (21.1%)	3 (13.6%)	1 (3.8%)	4 (6.9%)	12 (12.8%)	7 (14.3%)	1 (2.0%)
	(またはそれ)以上								

表282 煮物の摂取頻度

		人数(%)					
		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	700 (100.0%)	50 (100.0%)	170 (100.0%)	277 (100.0%)	112 (100.0%)	91 (100.0%)
	ほとんど食べない	68 (9.7%)	11 (22.0%)	18 (10.6%)	21 (7.6%)	11 (9.8%)	7 (7.7%)
	週に1~3回	440 (62.9%)	32 (64.0%)	123 (72.4%)	184 (66.4%)	56 (50.0%)	45 (49.5%)
	週に4~5回	114 (16.3%)	4 (8.0%)	22 (12.9%)	47 (17.0%)	22 (19.6%)	19 (20.9%)
	1日1回ぐらい	54 (7.7%)	3 (6.0%)	5 (2.9%)	17 (6.1%)	15 (13.4%)	14 (15.4%)
	1日に2回以上	24 (3.4%)	0 (0.0%)	2 (1.2%)	8 (2.9%)	8 (7.1%)	6 (6.6%)
	総数	805 (100.0%)	77 (100.0%)	181 (100.0%)	290 (100.0%)	131 (100.0%)	126 (100.0%)
女性	ほとんど食べない	34 (4.2%)	7 (9.1%)	11 (6.1%)	8 (2.8%)	4 (3.1%)	4 (3.2%)
	週に1~3回	482 (59.9%)	56 (72.7%)	124 (68.5%)	172 (59.3%)	68 (51.9%)	62 (49.2%)
	週に4~5回	166 (20.6%)	7 (9.1%)	32 (17.7%)	69 (23.8%)	29 (22.1%)	29 (23.0%)
	1日1回ぐらい	92 (11.4%)	5 (6.5%)	12 (6.6%)	30 (10.3%)	22 (16.8%)	23 (18.3%)
	1日に2回以上	31 (3.9%)	2 (2.6%)	2 (1.1%)	11 (3.8%)	8 (6.1%)	8 (6.3%)

表283 焼き物の摂取頻度

		人数(%)					
		総数	青年期 (20~29歳)	壮年期 (30~44歳)	中年期 (45~64歳)	前期高齢期 (65~74歳)	後期高齢期 (75歳以上)
男性	総数	700 (100.0%)	50 (100.0%)	170 (100.0%)	277 (100.0%)	112 (100.0%)	91 (100.0%)
	ほとんど食べない	64 (9.1%)	4 (8.0%)	8 (4.7%)	29 (10.5%)	12 (10.7%)	11 (12.1%)
	週に1~3回	479 (68.4%)	38 (76.0%)	122 (71.8%)	187 (67.5%)	72 (64.3%)	60 (65.9%)
	週に4~5回	111 (15.9%)	3 (6.0%)	33 (19.4%)	43 (15.5%)	19 (17.0%)	13 (14.3%)
	1日1回ぐらい	42 (6.0%)	5 (10.0%)	7 (4.1%)	15 (5.4%)	8 (7.1%)	7 (7.7%)
	1日に2回以上	4 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.1%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
	総数	805 (100.0%)	77 (100.0%)	181 (100.0%)	290 (100.0%)	131 (100.0%)	126 (100.0%)
女性	ほとんど食べない	60 (7.5%)	5 (6.5%)	12 (6.6%)	17 (5.9%)	12 (9.2%)	14 (11.1%)
	週に1~3回	554 (68.8%)	59 (76.6%)	144 (79.6%)	189 (65.2%)	86 (65.6%)	76 (60.3%)
	週に4~5回	135 (16.8%)	5 (6.5%)	22 (12.2%)	64 (22.1%)	24 (18.3%)	20 (15.9%)
	1日1回ぐらい	48 (6.0%)	7 (9.1%)	3 (1.7%)	16 (5.5%)	8 (6.1%)	14 (11.1%)
	1日に2回以上	8 (1.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	4 (1.4%)	1 (0.8%)	2 (1.6%)